




جامعة الأزهر  
كلية الزراعة بنين - القاهرة  
قسم النبات الزراعي

# مورفولوجيا وتشريح النبات


2025

الرسومات التوضيحية






بذرة الفول بزره لاسويدائيه




جنين بذرة الفول




إنبات بذرة الفول إنبات أرضي






مراحل إنبات بذرة الخروع *Ricinus comunis*





مراحل إنبات بذرة القطن  
*Gossypium barbadense*







مراحل الإنبات تحت الأرضي في حبة الذرة

*Zea mays*












الشكل العام للنبات الزهري









## أشكال الجذور الأصلية

- 1- جذر أصلي وتدي غير مخزن. 2- جذر أصلي وتدي مخزن مخروطي. 3- جذر أصلي وتدي مخزن كروي أو لفتي. 4- جذر أصلي وتدي مخزن مغزلي.





جذر ليفي



جذر مسند



جذر شام



جذر درني أو أنبوبی



جذر هوائي وآخر دعامي



جذر تسلقي



جذر تطغلي أو جذر ماص



جذور تنفسية





ساق قصيرة قزمية



ساق قصيرة قرصية



ساق طويلة

## الساق من حيث الطول



cylindrical  
اسطوانى



quadrangular  
الرباعى




angular  
المضلع



triangular  
التلاتى




flattened




اشكال الساق فى المقطع العرضى





تفرع جانبي كاذب المحور  
العنب





تفرع جانبي صادق المحور  
الكازورينا




تفرع قمي ثنائي الشعبة  
في طحلب الفيوكاس *Fucus*






ب- درنة



أ- ريزومة

## أنواع السوق الأرضية





د- بصلة





ج- كورمة

### أنواع السوق الأرضية



## د- السوق الجارية Runners stems

وهي تشبه السابقة لكن تختلف عنها في أنها تحمل جذور عرضية عند العقد وأحيانا تحمل أفرع هوائية تقابل هذه الجذور وذلك كما في نبات الشليك (*Fragaria vesca*) واليبيا *Lippia nodiflora* ونبات البطاطا، لذلك يمكن استخدامها في التكاثر الخضرى عكس الساق الزاحفة.








متسلقة بالإنفاف



متسلقة بالجذور العرضية




متسلقة بالمحاليق



متسلقة بالاشواك







ساق شوكية (العاقول)



ساق عصيرية (التين الشوكي)



ساق محلاقية (العنب)



ساق ورقية

بعض التحورات الشكلية في السوق




أوراق مفككة

برعم طرفي

أوراق حرشفية محكمة الغلق

حراشيف

ق. ط في البرعم





البرعم صيفي في نبات الملفوف

برعم شتوي في الحور

البراعم من حيث نشاطها






البراعم من حيث مكانها



البراعم من حيث ما ينتج عن تكشفها





## أذينات شوكية في السنط



## قاعدة منتفخة كما في أوراق البوانسيانا





## ٢- العنق The petiole

هو ذلك الجزء الإسطوانى غالباً الذى يصل النصل بالساق عند منطقة العقدة . قد يكون جناحي النصل متصلين مباشرة بالعقدة التي توجد عندها الورقة ويختفي العنق تماماً فتسمى الورقة جالسة Sessile كما فى الكتان وقد يكون للورقة عنق واضح يصل ما بين القاعدة والنصل فتعرف الورقة بأنها معنقة Petiolate كما فى الدورانتا أو أحيانا يوجد عنق قصير صعب التمييز لكنه يختلف فى لونه قليلا عن لون النصل والساق وتعرف الورقة فى هذه الحالة بأنها شبه جالسة.



أوراق معنقة كما فى الدورانتا



أوراق جالسة كما فى الكتان



## الأوراق البسيطة.

الأوراق البسيطة غير المفصصة لها أشكال متعددة منها مايلي:-



- إبرية Acicular وهي رفيعة مستطيلة اسطوانية عادة وحيدة العرق كما في الصنوبر



- شريطية Linear وهي ذات نصل عريض نسبيا وطويل ومفلطح كما في النجيليات.



- انبوبية Tubular حيث تكون الورقة عبارة عن انبوبية خضراء مجوفة كما في البصل.



- رمحية Lanceolate النصل يشبه الرمح قاعدته متسعه وقمته ضيقه كما في الكافور



- بيضية Ovate شكلها بيضي عريض عند القاعدة ونسبة الطول للعرض ٤ الى ١ تقريبا كما في الدورنتا.





- قلبية Cordate شكل القلب تقريبا قمته مدببة وقاعدتها ذات فصين مستديرين كما في البطاطا *Ipomea*.



- كلوية Raniform شكلها يشبه شكل الكلية وعرضها أكبر من طولها كما في الخبيزة



- سهمية Sagittate تشبه السهم وفصي القاعدة مدبيان و يتجهان للخلف الى أسفل كما في نبات القطب *Sagittaria*



- مزراقية Hastate وهي تشبه السهمية لكن فصي القاعدة يتجهان الى الخارج كما في العليق *Convolvulus arvensis*



- ملعقية Spathulate اي تشبه الملاعة كما في نبات الاقحوان *Calendula*





- قرصية (دراعية) Peltate وهي مستديرة ويتصل العنق بها من منتصف النصل كما في ابو خنجر *Tropaeolum*

## الأوراق البسيطة المفصصة

فهي إما مفصصه راحيه Palmately-lobed إذا كانت الفصوص متجهه الى القاعدة كما في القطن والعنب.



عميقة التفصص  
الراحي



ضحلة التفصص  
الراحي

أومفصصه ريشية Pinnately-lobed إذا كان التفصيص متجه ناحيه العرق الوسطى كما في البطيخ والخيار ومعظم القرعيات. وهي قد تكون بسيطة التفصيص أو مجزأة أو مشرحة حسب قرب أو بعد التفصيص عن العرق الوسطى




عميقة التفصص الريشي

ضحلة التفصص الريشي





مركبة ريشية



مركبة راحية





قاعدة سهمية



قاعدة مزراقية



قاعدة مسحوبة (مستدقة)



قاعدة قلبية



قاعدة درعية



قاعدة مستديرة



قاعدة مثلثة



قاعدة مسطحة

## أشكال قاعدة النصل





أ- كاملة , ب- منشارية , ج- مسننة , د- مقروضة , هـ- متعرجة ,  
و- شوكية





قمة حادة




قمة مستدقة



قمة مذنبية



قمة منخفضة



قمة مستديرة



قمة معقودة




قمة شوكية

## أشكال قمة النصل



## ٢- تعريق شبكى راحي Reticulate Palmate venation

ويوجد في الأوراق راحية التفصص وفيه يوجد أكثر من عرق يمتد في أحد الفصوص، تلتقي جميعا في موضع واحد عند قاعدة النصل أو قمة العنق، وتشبه في ذلك التقاء الأصابع في راحة اليد ومثل هذه الورقة توجد في نبات الخروع و نبات العنب.



متوازي عرضي



متوازي طولي



شبكى راحي



شبكى ريشي





متبادل



محيطی او سواری




متقابل متوازی



متقابل مصالب



أوراق ساقیه



أوراق جذریه




أوراق فلقية



قنابات




أوراق أولية



أوراق حرشفية

1- Scale leaves  
Ex. *Cynodon* sp

أوراق حرشفية  
التجيل




أوراق زهرية



*Raunculus aqualitis*



*Zilla spinosa*





## ٥- أوراق عصيريه .

مثال ذلك أوراق الأبال التي تخزن فيها مواد غذائية وأوراق الرطريط *Zygophyllum* والغاسول وهما من النباتات الصحراوية حيث الأوراق متشحمة لإخترنها الماء كما أن أعناق وأوراق نبات الرطريط تكون عصيرية اسطوانية الشكل وممتلئتان بالماء.



أوراق عوامه :



Storage leaves

أوراق تخزينية





2- Tendrils  
c- Modified stipules to tendrils  
Ex. *Smilax sp*

مخلوق



2- Tendrils  
b- Modified leaflet of compound leaf to tendrils  
Ex. *Pisum sativum*

مخلوق

البسلة



2- Tendrils  
a- Modified whole leaf to tendrils  
Ex. *Lathyrus aphaca*

مخلوق

الدحرج




مخلوق (ورقة غاملة متحورة) - مثال الدحرج

مخلوق (ورقة متحورة) - مثال البسلة

مخلوق (أنيبات متحورة) - مثال سمبلاكنس

## التحورات المختلفة لأجزاء الورقة





**Nepenthes (pitcher plant)**  
النبتة (نبات الأبريق)




**Nepenthes (pitcher plant)** (نبات الأبريق)

## ٢- الدروسيرا (ندى الشمس)

نصل الورقة قرصية ومغطى بزوائد طويلة حساسة غديه دبوسية الشكل تفرز قمعها إفراز حامضي لزج يحتوي علي إنزيمات هاضمه وتكون هذه الزوائد طويلة في الأطراف وتقتصر ناحية مركز النصل، عندما تحتك حشره صغيره بأي من هذه الزوائد تلتصق بالإفراز اللزج وكل أو بعض زوائد الورقة الحساسه الاخرى تنحني وتلتصق بالحشره وبذلك يزداد إحكام الورقة علي الحشرة ثم يحدث القتل والهضم والإمتصاص للحشره .

**Nepenthes (pitcher plant)**



**Entire plant of Drosera sp.** (نبات الندى للشمس)  
Sundew (ندى الشمس)




**Entire plant of Drosera sp.** (نبات الندى للشمس)  
Sundew (ندى الشمس)



**Drosera** (ندى الشمس)





The entire plant of *Dionaea* sp. النبات الكامل للدايونيا


***Dionaea* sp** النبات الكامل للدايونيا





*Utricularia* sp


حامل الماء




The entire plant of *Utricularia* sp

نبات حامل الماء الكامل






رسم تخطيطي يوضح تركيب الخلية النباتية النموذجية



مجسم يوضح المكونات الأساسية للخلية النباتية النموذجية






النقرة المصفوفة الزوجية      بسيطة زوجية      النقرة النصف مصفوفة


رسم تخطيطي يوضح الأنواع المختلفة من النقر






رسم تخطيطي للشبكة الإندوبلازمية.







رسم تخطيطي يوضح تركيب الميتوكوندريا





مجسم يوضح تركيب الميتوكوندريا






مجسم يوضح تركيب البلاستيدة الخضراء






مجسم يوضح تركيب النواة





شكل يوضح الأنواع المختلفة من حببيات النشا.






بلورة معينة



بلورة نجمية




بلورة إبرية (رافيدات)




الحوصلة الحجرية بلورة من كريونات  
الكالسيوم في ورقة مطاط الهند

شكل يوضح الأنواع المختلفة من البلورات






## قمة نامية فى ساق ( نسيج ميرستيمى )




## قمة نامية فى جذر ( نسيج ميرستيمى )






رسم توضيحي لمواقع الميرستيمات في النبات






بارنشيمة ممثلة (كلورانشيمية)


بارنشيمة عادية



بارنشيمة مخزنة للماء




بارنشيمة هوائية




بارنشيمة مخزنة للتاتينات



بارنشيمة مخزنة للبروتين حبيبة الأليرون






بارنشيمة مخزنة للنشا




بارنشيمة مخزنة للبلورات












## الألياف



خلية حجرية على


شكل حرف L




خلية حجرية عظمية




خلية حجرية عصوية



خلية حجرية مستديرة



خلية حجرية شعرية



خلية حجرية نجمية


## أشكال الخلايا الحجرية




Simple



Double




Multiple



أنواع نسيج البشرة طبقاً لعدد طبقاتها





الخلايا الحارسة للشقوق


خلايا البشرة

فتحة الثغر

خلايا مساعداة

الثغر العظمي

نباتات ذوات الفتحة الواحدة



الخلايا الحارسة للثغر

خلايا البشرة


فتحة الثغر

بلاستيدات خضراء


الثغر الكلوي

نباتات ذوات الفتحتين







**Diacytic**




**Desmocytic**



**Pericytic**




**Polocytic**




**Paracytic**




**Anisocytic**




**Tetracytic**




**Cyclocytic**



**Anomocytic**




**Actinocytic**



**Hexacytic**

انواع الثغور







شعيرة وحيدة الخلايا




شعيرة عديدة الخلايا




شعيرة غدية




شعيرة درعية



شعيرة لاسعة




شعيرة نجمية عديدة الخلايا




شعيرة شجرية

شكل يبين أنواع مختلفة من الشعيرات.






أنواع العناصر الوعائية بنسيج الخشب، أ: عنصر وعائي ذو صفائح مثقبة سلمية في كلا الطرفين ب: عنصر وعائي ذو صفيحة مثقبة سلمية في طرف وصفيحة مثقبة بسيطة في الطرف الآخر، ج: عنصر وعائي ذو صفائح مثقبة بسيطة في كلا الطرفين.



الشكل العام للقسييات.



## اهم الفروقات بين القصيبات والاعوية:




القصيبات tracheids	الاعوية vessels
1- تمثل كل قصيبة خلية مستقلة ذات نهاية مسدودة	1- تمثل تركيب انبوبي متعدد الخلايا يطلق على كل خلية وحدة وعائية
2- لا تحتوي على الصفائح المثقبة	2- تكون الجدران النهائية المستعرضة لوحدات الوعاء مثقبة او ذاتبة بصورة كلية
3- يتم انتقال المواد من قصيبة الى اخرى عن طريق النقر الموجودة في الجدران الفاصلة بينهما	3- يتم انتقال المواد عبر الصفائح المثقبة في الوعاء الواحد او من خلال النقر بين وعاء وآخر
4- تمثل العنصر الناقل الوحيد في خشب عاريات البذور والنباتات الواطئة	4- يمثل عناصر النقل في مغطاة البذور
5- تعتبر اقل رقا من الاعوية	5- تعتبر اقل رقا من القصيبات

رسم يوضح أنواع التغلظ في الخشب:

(1) حلزوني (2) حلقي (3) شبكي (4) منقر






اهم الفروق بين الخشب الربيعي (المبكر) ( والخشب الصيفي ) ( المتأخر)

الخشب الربيعي (المبكر)	الخشب الصيفي (المتأخر)
<p>1- الأوعية واسعة ورقيقة الجدر</p> <p>2- لا يحتوي على ألياف</p> <p>3- كمية الأوعية المتكونة أعلى</p> <p>4- تتكون في موسم الربيع وبداية الصيف</p>	<p>الأوعية ضيقة وسميكة الجدر</p> <p>يحتوي على الكثير من الألياف</p> <p>كمية الأوعية المتكونة أقل</p> <p>يتكون أواخر موسم الصيف</p>




منشأ يختلف عن منشأ الخلايا الغربالية، حيث تنشأ الخلايا الزلائية من خلايا بارنشيمية اللحاء، أو من خلايا أشعة اللحاء الثانوية، بينما تنشأ الخلايا الغربالية من الكامبيوم الأولي، وتمثل الخلايا الغربالية جهاز توصيل الغذاء في النباتات عاريات البذور.




شكل يوضح مساحة غربالية حديثة، لاحظ محتويات الثقب وأسطوانة الكالوز الذي تحيط به.

ب- عناصر الأنابيب الغربالية (Sieve tube elements) وهي عبارة عن خلايا قصيرة متسعة ذات جدر سليولوزية رقيقة تخلو من اللجنين. وتتميز خلايا هذه العناصر بوجود مساحات غربالية متخصصة في جدرانها الطرفية تعرف بالصفائح الغربالية (Sieve plates)، وقد تكون الصفائح الغربالية بسيطة (Simple sieve plates) عندما تحتوي على مساحة غربالية واحدة، أو مركبة Compound sieve plates عندما تحتوي على عدد من المساحات الغربالية. وتتصل خلايا عناصر الأنابيب الغربالية بعضها ببعض عن طريق الجدر الطرفية ذات الصفائح الغربالية مكونة بذلك سلسلة طويلة من عناصر الأنابيب الغربالية تسمى الأنبوب الغربالي (Sieve tube)، وبذلك فإن الأنبوب الغربالي عبارة عن صف من خلايا عناصر الأنابيب الغربالية تتصل ببعضها بواسطة الجدر الطرفية ذات الصفائح الغربالية.




قطاع طولي لعنصرين من الأنابيب الغربالية.





الشكل يوضح نشأة عنصر الأنبوب الغربالي والخلية المرافقة. أ: خلية الأنبوب الغربالي الأم في طور الانقسام، ب: الخلية الأم بعد الانقسام طولياً إلى خليتين غير متساويتين، لاحظ طليعة الخلية المرافقة في مرحلة الانقسام غير المباشر، ج: الخلية في مرحلة تحلل النواة والغشاء الداخلي، والعضيات ونشأت ثقبوب الصفيحة الغربالية، د: عنصر الأنبوب الغربالي، والخلايا المرافقة والصفيحة الغربالية. ١. جدار الخلية، ٢. أجسام بروتينية، ٣. روابط بلازمية، ٤. النواة، ٥. طليعة الخلية المرافقة، ٦. تحلل غشاء الفجوة، ٧. تحلل النواة، ٨. الصفيحة الغربالية، ٩. خلايا مرافقة، ١٠. عنصر الأنبوب الغربالي.






رسم تخطيطي يوضح الحزمة الوعائية القطرية.




الحزمي بين اللحاء والخشب فتسمى الحزمة الوعائية الحزمة الوعائية الجانبية المغلقة (Closed collateral vascular bundle) كما في السيقان واوراق نباتات ذوات الفلقة الواحدة.



رسم تخطيطي يوضح الحزم الوعائية الجانبية، أ: حزمة جانبية مفتوحة ذات عاء واحد،  
ب: حزمة جانبية مغلقة، ج: حزمة وعائية جانبية ذات لحاءين.

- الحزم الوعائية المركزية (Concentric vascular bundle) في هذا النوع من الحزم الوعائية يحيط أحد النسيجين بالآخر، ويمكن تمييز أحد النوعين التاليين:



أ. حزم وعائية محيطية اللحاء أو مركزية الخشب  
وفيها يحيط نسيج اللحاء بنسيج الخشب كما في النباتات السرخسية (Peridophytes)  
ب. حزم وعائية محيطية الخشب أو مركزية اللحاء. في هذه الحزم يحيط نسيج الخشب بنسيج اللحاء.



رسم تخطيطي يوضح الحزم الوعائية المركزية،

أ. حزمة وعائية محيطية اللحاء،  
ب. حزمة وعائية محيطية الخشب.





الشكل العام للعديسة
















97 Stem, TS, *Tilia*, first year Mag. 20



98. Stem, TS, *Tilia*, second year Mag. 20




99. Stem, TS, *Tilia*, fourth year Mag. 20











رسم تخطيطي يوضح ق.ع لجذر نبات من ذوات الفلقتين




رسم تفصيلي يوضح ق.ع لجذر نبات من ذوات الفلقتين







رسم تخطيطي يوضح ق.ع لجذر نبات من ذوات الفلقة الواحدة



**T.S of the Monocot Root**


رسم تفصيلي يوضح ق.ع لجذر نبات من ذوات الفلقة الواحدة





الشكل يوضح نشأت الجذور الثانوية






قطاع عرضى يوضح خروج الجذر الجانبى من منطقة البريسكل كما يبدو تحت المجهر










قطاع عرضي في ساق حديث من ذوات الفلقة الواحدة






قطاع عرضى فى ورقة نبات من ذوات الفلقتين

T.S. in dicot leaf






رسم لقطاع عرضى فى ورقة نبات من ذوات الفلقة الواحدة.

*T.S. in Monot. leaf*






رسوم تخطيطية تبين بعض نظم التحول من التركيب الوعائي الجذر إلى التركيب الوعائي اللامع خلال المنطقة التي يحدث بها هذا التحول . لاحظ أن الجذر إلى أسفل والامع إلى أعلى ، وبينهما خطوات التحول في المستويات المختلفة . الغيب غمط والعماء منقط .

( Farnes & Mac D. عن )




## Fleshy Xerophytes نباتات الجفاف اللحمية

قد تلجأ النباتات إلى الإحتفاظ بكميات كبيرة من الماء داخل جسم معا مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهورها بمظهر لحمي ولذلك فهي تسمى بنباتات الجفاف اللحمية Fleshy xerophytes وتكون هذه النباتات أوراق أو سيقان لحمية تحتوي بداخلها على نسيج حشوي خازن للماء كما يحتوي بالإضافة إلى ذلك على مواد هلامية وهذا الماء المختزن يمكن الاحتفاظ به حتى فترة الجفاف حين يحتاج النبات إلى إستخدامه ويتركب النسيج الخازن للماء من خلايا برنشيمية حية كبيرة الحجم بدرجة غير عادية وتحتوي على سيتوبلازم خارجي رقيق وفجوة مركزية واسعة مملوءة بالماء أو بسائل هلامي . وهذا النسيج الخازن قد يؤدي مهمة سد حاجة النبات إلى الماء أثناء الجفاف كما أنه يحفظ الأنسجة الداخلية من أشعة الشمس الحارة الساقطة على سطح النبات.




قطاع مستعرض في ورقة نيات الدفلة يبين بعض الخصائص الحافية





مقطع مستعرض لمساق نبات Elodea (نبات مائي)



قطاع مستعرض في مساق نبات خشب البط ( إيثونيا ) يبين بعض خصائص النباتات المائية.

الرقيقة.